

Monitor Weidevogelgrasland 2024



Cor Nonhof



**Natuurlijk
Delfland**

Natuurlijk Delfland
Postbus 133
2600 AC DELFT

natuurlijkdelfland@knnv.nl
website : delfland.knnv.nl
twitter: NatuurlijkDelfland
facebook: NatuurlijkDelfland
instagram: NatuurlijkDelfand

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Inzaaien	3
3	Commandeerpolder.....	4
3.1	Overzicht perceel 5	5
3.2	Overzicht perceel 9	6
3.3	Opnamen perceel 5 en 9.....	7
4	Opmerkingen.....	9

Copyright: Natuurlijk Delfland, 2024

Referentie: Cor Nonhof, Monitor Commandeerpolder 2023, Natuurlijk Delfland, 2024

Overname van delen van de tekst is toegestaan onder bronvermelding.

1 Inleiding

In 2020 is het weidevogelkerngebied in de Commandeerpolder ingericht voor de weidevogels en een verhoging van de biodiversiteit. Van 2020 tot 2023 zijn daarover verslagen verschenen, waarbij in 2021 en 2023 uitstapjes zijn gemaakt naar voorbeelden van graslanden die ongewijzigd in een ouderwets beheer zijn geweest zonder al te veel bemesting.

Links naar verslagen vanaf 2020:

<https://delfland.knnv.nl/kennisbank/vegetatie-weidevogelkerngebied-commandeerpolder/>.

2 Inzaaien


Weidevogels hebben last van de zware bemesting van de graslanden. Het geeft soortenarmoede en daarmee weinig insectenleven. Het geeft snelle groei en daarmee in het voorjaar voor de kuikens een ondoordringbaar koude en natte leefomgeving. Meer kruiden en minder snelle groei zijn gewenst om de weidevogels te helpen.

Om snel resultaat te boeken wordt overal ingezaaid met kruidenrijke mengsels waaronder de halfparasiet grote ratelaar om de groei van gras te onderdrukken. Ook in de Commandeerpolder is dit gedaan en op percelen in de Dijkpolder en de Duifpolder en ook voor het weidevogelkerngebied in de Klaas Engelbrechtpolder staat het weer in de plannen. De grote vraag is: waarom staan die soorten er nu niet en waarom moeten die worden ingezaaid? Het antwoordt is dat die soorten er vaak niet van nature thuishoren en het beheer of de bodem of de waterhuishouding geeft andere soorten een betere kans. Je ziet dan ook dat de ingezaaide soorten of niet opkomen of al snel weer verdwijnen. En als ze wel opkomen kijkt de boer er vreemd tegenaan en vraagt zich af of het wel goed is.

Graslanden zijn het resultaat van bestendig beheer. Veertig miljoen jaar geleden is dat begonnen in Zuid Amerika door grazers en daar is door de mens het hooien aan toegevoegd. Elk jaar hetzelfde patroon van hooien en beweiden en bemesten. Voor weidevogelgrasland met de eisen voor doorwaadbaar grasland en soortenrijkdom: zo min mogelijk bemesten. Na zo'n tien jaar komt dan de soortenmix in evenwicht bij dit beheer. Op hooilanden zijn dat de soorten van het glanshaverhooiland en op weiden die van de kamgrasweiden en bij hooien met naweiden toch voornamelijk de soorten van de kamgrasweiden.

3 Commandeerpolder

Dit is de vijfde keer dat in het weidevogelkerngebied een inventarisatie van de graslanden is gedaan. Voor trendanalyse zijn, afhankelijk van de signaal-ruis-verhouding, minimaal vijf waarnemingen nodig. Het is verleidelijk en ook veel gedaan om toch te vergelijken met vorig jaar. Die verleiding wordt niet helemaal weerstaan.



3.1 Overzicht perceel 5



Perceel 5 – 0 meter



10 meter (haard van grote ratelaar)



Perceel 5 – 20 meter



30 meter



Perceel 5 – 40 meter



50 meter

3.2 Overzicht perceel 9



Perceel 9 – 0 meter



10 meter



Perceel 9 – 20 meter



25 meter

3.3 Opnamen perceel 5 en 9

Locatie 4, 5 en 8 zijn oevers en kennen daardoor meer soorten dan de pure graslanden.

Locatie 3 en 6 zijn ingezaaid.

Locatie 2 en 4 zijn respectievelijk een plasdrasgreppel en een afgeschuinde oever.

Locatie 5 en 8 zijn een steile en een afgeschuinde oever.

Locaties 1 t/m 4 liggen in perceel 5 en 5 t/m 8 in perceel 9.

Tabel nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	CBS_nr	Wetenschappelijke naam
Grote vossenstaart	1		2b	1	1	1	1	2a	42	Alopecurus pratensis
Gewone hoornbloem	+			+	1	1	2a		296	Cerastium fontanum s. vulgare
Gestreepte witbol	2a		2b	3	2b	2a	2a	2b	631	Holcus lanatus
Engels raaigras	1		2b	1	1	1	2m	1	756	Lolium perenne
Ruw beemdgras	1		2b	1	2a	2m	2m	2m	959	Poa trivialis
Veenwortel	1	1	2b	2b	2a	1	2a	1	967	Persicaria amphibia
Scherpe boterbloem	r				+	+		1	1040	Ranunculus acris
Kruipende boterbloem	+		1	1	+	2a	1		1056	Ranunculus repens
Grote ratelaar	3								1066	Rhinanthus angustifolius
Veldzuring	+		+	2a	1		1	+	1093	Rumex acetosa
Krulzuring	r			+	1	+	1	1	1098	Rumex crispus
Zachte dravik s.l.	1		1				1	1	2337	Bromus hordeaceus
Fioringras		2m							18	Agrostis stolonifera
Geknikte vossenstaart		2m							40	Alopecurus geniculatus
Gewone waterbies		3							437	Eleocharis palustris
Mannagras		2m	2b	1					584	Glyceria fluitans

Tabel nummer	1	2	3	4	5	6	7	8		
Nederlandse naam									CBS_nr	Wetenschappelijke naam
Liesgras		3		2b					585	Glyceria maxima
Rietgras		2m	1	1	2a	4	4		930	Phalaris arundinacea
Pinksterbloem				+					205	Cardamine pratensis
Akkerdistel				+					331	Cirsium arvense
Harig wilgenroosje				1					451	Epilobium hirsutum
Gele lis				+	r				665	Iris pseudacorus
Echte koekoeksbloem				1					772	Lychnis flos-cuculi
Watermunt				1	+				813	Mentha aquatica
Akkervergeet-mij-nietje				1					840	Myosotis arvensis
Moerasvergeet-mij-nietje				1	1				844	Myosotis scorpioides
Grote brandnetel				+				1	1321	Urtica dioica
Grote egelskop s.s.				1	+				1533	Sparganium erectum s. erectum
Kantige basterdwederik s.l.				r					1642	Epilobium tetragonum
Kleefkruid					1				546	Galium aparine
Slipbladige ooievaarsbek					2a		1	1	570	Geranium dissectum
Hondsdrif					+				582	Glechoma hederacea
Gewone margriet						+			319	Leucanthemum vulgare
Witte klaver						1			1306	Trifolium repens
Ruige zegge								1	235	Carex hirta
Riet								3	933	Phragmites australis

Codes volgens Braun Blanquet (B, DS); schaal 02 in Turboveg

B	Totale bedekking in proefvlak	Bedekking
r	< 5%	1 exemplaar
+	< 5%	2 – 5 exemplaren
1	< 5%	6 – 50 exemplaren
2m	< 5%	> 50 exemplaren
2a	5 – 12 %	Willekeurig aantal exemplaren
2b	13 – 25 %	
3	26 – 50 %	
4	51 – 75%	
5	76 – 100%	

4 Opmerkingen

De greppelplasdras op perceel 5 was al beëindigd en er groeide massaal gewone waterbies. Een enkele margriet houdt dapper stand.

De echte koekoeksbloem heeft het moeilijk zo te zien.

De haard van grote ratelaar is groter geworden.

Op perceel 9 is de dominantie van gestreepte witbol een stuk minder geworden.

Wij helpen je van de wal in de sloot.



Om te genieten van de natuur. Of om haar te bestuderen en te beschermen. Natuurlijk Delfland maakt je wegwijs in de natuur.



Natuurlijk Delfland

delfland.knnv.nl

